

Facilitation de la récolte en regroupant les variétés par période de maturité lors de l'implantation du verger : 1er groupe

| Sous-verger* | Période de cueillette | Pomme | | | Poire | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------|---------------------|
| | | Variété | Usages** | Groupe de floraison | Variété | Usages** | Groupe de floraison |
| 1ère récolte du 1er au 30 septembre | Début septembre | Reine des Reinettes | T, C, J/C | 4 | Triomphe de Vienne | T | 4 - 5 |
| | | Alkmene | T, C, J/C | 3 | | | |
| | | Reinette Evagil | T, C | 4 | | | |
| | mi-septembre | Transparente de Lesdain | T, C | 4 | Seigneur Esperen | T | 4 |
| | | Président Roulin | T, C | (2)-3 | Doyenné Boussoch | C | 3 |
| | | Reinette Descardre | C, J/C | 3 | Beurré Lebrun | T, C | 3 - 4 |
| | | Transparente de Croncels | T, C, J/C | 2-3 | Conférence | T, C | 4 - 5 |
| | | Reinette Rouge Etoilée | T, C, J/C | 5 | | | |
| | | Jacques Lebel | C | 4 | | | |
| | 2ème récolte du 1er au 31 octobre | début octobre | Cwastresse Double | T, J/C | 3-4 | | |
| Reinette de France | | | C, J/C | 7 | Duchesse d'Angoulême | T | 3 - 4 |
| Cwastresse Simple | | | T, J/C | 6 | Nec Plus Meuris | T, C | 2 |
| Court-Pendu Rouge | | | T, J/C | 6-7 | Jeanne d'Arc | T, C | 4 - 5 |
| Belle-Fleur de Brabant | | | J/C | 6 | | | |
| Reinette Hernaut | | T, C, J/C | 4 | | | | |
| mi-octobre | | Suntan | T, C, J/C | 6 | Jules d'Airoles | T | 6 |
| | | Gris Braibant | T, J/C | 3-4 | Beurré de Naghin | T | 3 - 4 |
| | | Reinette Dubois | T, C, J/C | 6 | Beurré Alexandre Lucas | T, C | 1 - 2 |
| | | | | | Comtesse de Paris | T, C | 1 |
| | | | | Saint-Rémy | C | 4 | |
| 3ème récolte du 1er novembre jusqu'aux 1ère gelées | fin octobre | Sabot d'Eijsden | C | 6 | | | |
| | | Gueule de Mouton | J/C | 4 | | | |
| | | Jonathan | C | 4-5 | | | |
| | | Godivert | C, J/C | 3-4 | | | |
| | | Cabarette | C, J/C | 4 | | | |

(*) Afin de faciliter l'organisation de la récolte des fruits dans votre verger lorsque celui-ci est pâturé, il est préconisé d'agencer vos variétés en les regroupant par groupe de cueillette. Cela vous permet d'organiser un pâturage tournant et de séparer le pâturage de la récolte. Il est plus aisé de réaliser la récolte des fruits dans une prairie propre, sans bétail et dans une même zone. La période de cueillette de la variété est la référence afin de débiter la récolte dans cette partie du verger. L'ensemble du verger peut être subdivisé en 3 sous-vergers où le bétail peut transhumer en fonction des dates de maturité des fruits. Le bétail doit sortir du verger au strict minimum 2 semaines avant la récolte. Dans le choix des variétés, il est important de choisir au minimum 2 variétés ayant le même groupe de floraison ou un groupe voisin afin d'assurer et de faciliter la pollinisation. (**) T : Table ; C : Culiniaire ; J/C : Jus/cidre

