

Facilitation de la récolte en regroupant les variétés par période de maturité lors de l'implantation du verger : 2ème groupe

Sous-verger *	Période de cueillette	Pomme			Poire		
		Variété	Usages**	Groupe de floraison	Variété	Usages**	Groupe de floraison
1ère récolte du 1er août au 14 septembre	début août	Transparente Blanche	C	2			
	mi-août	Grenadier	C	2-3	Précoce de Trévoux	T	2
					Précoce Henin	T	3
	fin août				Clapp's Favourite	T	6
					Bon Chrétien Williams	T, C	4
				Ananas de Courtrai	T	3	
				Calebasse à la Reine	T, C	4 - 5	
2ème récolte du 15 septembre au 14 octobre	mi-septembre	Transparente de Lesdain	T, C	4	Seigneur Esperen	T	4
		Président Roulin	T, C	(2)-3	Doyenné Boussoch	T, C	3
		Reinette Descardre	T, C, J/C	3	Beurré Lebrun	T, C	3 - 4
		Transparente de Croncels	T, C, J/C	2-3	Conférence	T, C	4 - 5
		Reinette Rouge Etoilée	T, C, J/C	5			
		Jacques Lebel	C, J/C	4			
	fin septembre	Reinette de Chênée	T, C, J/C	4	Louise Bonne d'Avranches	T	2 - 3
		Belle-Fleur de France	T, C, J/C	5	Beurré Chaboceau	T, C	4 - 5
		Saint Louis	C	4	Beurré Hardy	T	4
		Reinette Galopin	T, C, J/C	5	Durondeau	T, C	4
		La Paix	T, J/C	3-4	William's Duchess	T, C	4
		Reinette de Blenheim	T, C, J/C	2-3	Saint-Mathieu	T, C	5
		Radoux	T, C, J/C	4	Légipont	T, C	3 - 4
		Belle-Fleur Large Mouche	C, J/C	4			
		Belle de Boskoop	T, C, J/C	2			
		Joseph Musch	T, C, J/C	2			
		Reinette de Waleffe	T, C, J/C	5			
		3ème récolte du 15 octobre jusqu'aux 1ère gelées	mi-octobre	Suntan	T, C, J/C	6	Jules d'Airoles
Gris Braibant	T, C, J/C			3-4	Beurré de Naghin		3 - 4
Reinette Dubois	T, C, J/C			6	Beurré Alexandre Lucas		1 - 2
					Comtesse de Paris		1
fin octobre					Saint-Rémy		4
	Sabot d'Eijsden		C	6	Joséphine de Malines		5
	Gueule de Mouton		J/C	4			
	Jonathan		T, C, J/C	4-5			
	Godivert		T, C, J/C	3-4			
	Cabarette		T, C, J/C	4			

(*) Afin de faciliter l'organisation de la récolte des fruits dans votre verger lorsque celui-ci est pâturé, il est préconisé d'agencer vos variétés en les regroupant par groupe de cueillette. Cela vous permet d'organiser un pâturage tournant et de séparer le pâturage de la récolte. Il est plus aisé de réaliser la récolte des fruits dans une prairie propre, sans bétail et dans une même zone. La période de cueillette de la variété est la référence afin de débiter la récolte dans cette partie du verger. L'ensemble du verger peut être subdivisé en 3 sous-vergers où le bétail peut transhumer en fonction des dates de maturité des fruits. Le bétail doit sortir du verger au strict minimum 2 semaines avant la récolte. Dans le choix des variétés, il est important de choisir au minimum 2 variétés ayant le même groupe de floraison ou un groupe voisin afin d'assurer et de faciliter la pollinisation. (**) T : Table ; C : Culiniaire ; J/C : Jus/cidre

